

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Подготовка к ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ

Исследование проводится при уровне сахара в крови **не выше 11 ммоль/л**.

В случае стабильно высокого фонового уровня сахара крови (выше 11 ммоль/л) необходимо сообщить эту информацию **сотруднику колл-центра МИБС** при записи, а также рассмотреть возможность ПЭТ/КТ с другим РФП, например **68Ga-FAPI**.

Сахарный диабет I типа — применение инсулина

⚠ ИНСУЛИН ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ИССЛЕДОВАНИЕМ НЕ ПРИМЕНЯТЬ!

Прекратить приём пищи за **4 часа** до исследования.

Схема применения инсулина перед ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ:

Тип инсулина	Последнее применение
Ультракороткий вдыхаемый продолжительность действия 2–3 ч	за 2 ч до визита
Ультракороткий продолжительность действия 3–5 ч	за 4 ч до визита
Короткого действия продолжительность действия 6–8 ч	за 7 ч до визита
Промежуточного действия продолжительность действия до 26 ч	за 24 ч до визита
Инсулиновая помпа	отключить за 4 ч до визита

Сахарный диабет II типа — применение препаратов

Прекратить приём пищи за **6 часов** до исследования.

Схема применения препаратов перед ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ:

Препарат	Последний приём
Производные сульфонилмочевины глибенкламид, гликлазид, глипизид, глимепирид	за 12 ч
Ингибиторы ДПП-4 саксаглиптин, ситаглиптин, ситаглиптин	за 12 ч
Ингибиторы ИНГЛТ-2 дапаглифлозин, эмпаглифлозин, канаглифлозин	за 24 ч
Агонисты рецепторов ГПП-1 лираглутид, семаглутид	Консультация эндокринолога о замене / отмене препарата